

# Questionnaire d'Aide à l'Apparentement

## Accompagnant le Dossier complet d'Adoption pour la Bulgarie

**NOM :**

**Prénom(s) :**

**Rappel :** ce questionnaire doit être rempli avec l'aide d'un médecin.  
Toutes les lignes doivent être renseignées par une croix

Les cases peuvent être vides ou grisées horizontalement ou verticalement.

Les rayures verticales grises indiquent que votre notice doit préciser une ouverture.  
(par exemple: particularités soignables et opérables)



Les rayures horizontales grises signifient que vous devez être en possession d'une notice spécifique.  
(par exemple: particularités de santé ne mettant pas en danger la vie de l'enfant)



	OUI	NON	PEUT-ETRE
<b>CARACTERISTIQUES de l'ENFANT</b>			
<b>SEXE</b>			
Fille			
Garçon			
Indifférent			
<b>NOMBRE</b>			
un enfant			
fratrie de deux enfants			
fratrie de trois enfants et plus			
<b>AGE</b>			
de 0 à 2 ans			
de 2 à 3 ans			
de 3 à 4 ans			
de 4 à 5 ans			
de 5 à 6 ans			
de 6 à 7 ans			
de 7 à 8 ans			
de 8 ans et plus			
autres (prière d'indiquer l'âge)			
<b>ORIGINE ETHNIQUE</b>			
origine ethnique bulgare			
origine ethnique rom			
origine ethnique turque			
origine ethnique inconnue mais enfant à la peau claire			
autre origine ethnique			
<b>SITUATION FAMILIALE de l'ENFANT</b>			
Inconnue			
Consommation de drogues chez au moins un des parents sans séquelles observées chez l'enfant			
Consommation d'alcool chez au moins un des parents hors SAF chez l'enfant			
Maladie psychique chez la mère (schizophrénie, paranoïa, etc)			
Maladie psychique chez la mère avec prise de traitement pendant la grossesse			
Maladie psychique chez le père			
Casier judiciaire chez un des parents			
Retard mental connu d'un des parents			
Enfant issu d'un inceste			
Enfant issu d'un viol			
Enfant né séronégatif au VIH de mère séropositive			
Enfant né séropositif au VIH de mère séropositive et devenu séronégatif			
Enfant ayant souffert de malnutrition intra-utérine			
Enfant ayant souffert de malnutrition dans la première année de vie			
Enfant ayant souffert de négligence			
Enfant ayant souffert de maltraitance physique			
Enfant ayant subi des abus sexuel			
Enfant ayant vécu dans une grande précarité			

	OUI	NON	PEUT-ETRE
Enfant ayant vécu un échec de réintégration familiale ou à l'adoption			
Famille d'origine de l'enfant mise à l'écart (maladie psychique, handicap...)			
<b>DEVELOPPEMENT AFFECTIF ET SOCIAL</b>			
Autisme et / ou trouble envahissant du développement (TED)			
Hyperactivité / déficit de l'attention			
Agressivité physique			
Troubles du lien d'attachement ( mauvaises relations avec les pairs, approche des adultes et des enfants non discriminantes, comportement sexualisé, repli social)			
Troubles du comportement			
Balancement			
Intolérance à la frustration (réactions émotionnelles excessives ,opposition, crises de colère)			
Troubles obsessionnels compulsifs			
Troubles du sommeil			
Enurésie			
Encomprésie			
<b>RETARD DE DEVELOPPEMENT</b>			
Léger retard de développement psychomoteur			
Retard psychomoteur grave			
Léger retard de développement global			
Important retard de développement global			
Retard mental léger			
Retard mental important			
Retard de langage			
Troubles du langage (dysphasie, etc)			
Bégaiement			
Chuintement			
Difficultés de compréhension			
Dyslexie			
Difficultés d'apprentissage scolaire			
Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF)			
Troubles causés par alcoolisation fœtale (TCAF)			
<b>PATHOLOGIES CURABLES ou pour lesquelles il existe UNE PRISE EN CHARGE</b>			
Anémie par carence en fer			
Bronchites à répétition (et / ou bronchiolites)			
Pneumonies à répétition			
Asthme			
Dysplasie pulmonaire non-invalidante			
Allergies (respiratoire, alimentaire, cutanée)			
Eczéma			
Psoriasis			
Rachitisme			
Intolérance au lactose ou au gluten			
<b>ETAT PHYSIQUE DE L'ENFANT à la NAISSANCE et CONDITIONS de NAISSANCE</b>			
Syndrome de détresse respiratoire à la naissance			
Enfant né avant 37ème semaine d'aménorrhée (35ème semaine de grossesse)			
Enfant né avant 32ème semaines d'aménorrhée			
Enfant né avant 28ème semaines d'aménorrhée			
Poids de naissance à terme < 2,5kg (RCIU)			
Enfant prématuré avec retard de croissance intra utérin (RCIU)			
Constataion de malformation congénitale			
<b>PEAU de L'ENFANT</b>			
Tache bleue mongoloïde (disparaît avec le temps)			
Angiome tubéreux (en relief)			
Hémangiome (angiome rouge à la naissance)			
Petites taches congénitales			
Grandes taches congénitales			
Taches faciales congénitales			
Taches congénitales qui exigent une exérèse chirurgicale			

	OUI	NON	PEUT-ETRE
Petit naevus (grain de beauté)			
Grand naevus			
Petite cicatrice (brûlure, accident) non défigurante			
Petite cicatrice (brûlure, accident) défigurante à corriger avec une intervention chirurgicale (si possible)			
Cicatrice non invalidante, suite à une intervention chirurgicale			
Grande cicatrice (brûlure, accident) sur le corps			
Grande cicatrice (brûlure, accident) défigurante, à corriger avec une intervention chirurgicale (si possible)			
Albinisme			
<b>PROBLEMES DE LA CAVITE BUCCALE</b>			
Fente labiale			
Fente palatine			
Fente labiopalatine simple			
Fente labiopalatine bilatérale			
Déformation du visage consécutive à une de ces fentes			
<b>PROBLEME DE VUE</b>			
Problèmes de vue à corriger avec des lunettes (myopie...)			
Problèmes de vue à corriger par une intervention chirurgicale			
Strabisme (à corriger avec des lunettes)			
Strabisme (à corriger par une intervention chirurgicale)			
Enfant aveugle d'un œil (borgne)			
Enfant malvoyant			
Cécité complète			
Nystagmus			
Glaucome congénital			
Ptôsis important (chute d'une paupière supérieure)			
<b>PROBLEMES D'AUDITION</b>			
Infection des oreilles (par ex. otites chroniques)			
Déficit auditif demandant une aide orthophonique			
Déficit auditif demandant un appareillage			
Déficit auditif demandant une opération			
Surdité-mutité (sourd -muet)			
Surdité unilatérale sans mutité			
Surdité bilatérale sans mutité			
Oreille déformée (sans perte d'audition)			
Oreille déformée (avec perte d'audition)			
Agénésie du pavillon de l'oreille (sans perte d'audition)			
<b>PROBLEMES ORTHOPEDIQUES</b>			
Infirmité motrice cérébrale (paralysie cérébrale)			
Enfant ayant besoin d'être opéré d'une articulation (genou, cheville, coude...) ou d'un tendon			
Nanisme harmonieux			
Achondroplasie (nanisme)			
Inégalité des membres supérieurs			
Inégalité des membres inférieurs			
Pied bot varus équin			
Déformation plantaire, nécessitant une intervention réparatrice chirurgicale et/ou prise en charge kiné			
Agénésie ou amputation partielle d'un membre supérieur			
Agénésie ou amputation partielle d'un membre inférieur			
Agénésie ou amputation totale d'un membre supérieur			
Agénésie ou amputation totale d'un membre inférieur			
Déformation des doigts de la main			
Déformation des orteils			
Déformation du poignet ou de la main			
Déformation du bras			
Déformation du pied			
Déformation de la jambe			

	OUI	NON	PEUT-ETRE
Syndactylie des doigts (doigts soudés) ou doigts malformés			
Syndactylie des orteils (orteils soudés) ou orteils malformés			
Anomalie congénitale de hanche			
Difficultés à la marche (boiterie)			
Parésie			
Paraplégie			
Hémiplégie			
Arthrogrypose (flexion/contraction constante des articulations)			
Ostéogénèse imparfaite (fragilité osseuse)			
Nécessité d'un fauteuil roulant			
Cyphose ou scoliose			
<b>MALADIES du SANG</b>			
Thalassémie mineure			
Thalassémie majeure			
Drépanocytose (homozygote)			
Autres maladies du sang			
<b>MALADIES CONTAGIEUSES</b>			
Parasitoses intestinales			
Diarrhées chroniques			
Autre parasitose			
Primo-infection tuberculeuse traitée			
Tuberculose (maladie)			
Séropositivité de la mère à la syphilis mais traitée			
Syphilis congénitale traitée chez l'enfant			
Test positif hépatite B (porteur chronique)			
Test positif hépatite C (porteur chronique)			
Test positif HIV (porteur chronique)			
<b>TROUBLES CARDIAQUES</b>			
Souffle cardiaque fonctionnel			
Souffle cardiaque organique (cardiopathie congénitale)			
Cardiopathie valvulaire			
Communication inter auriculaire (CIA)			
Communication ventriculaire (CIV)			
Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)			
Autre malformation cardiaque pouvant nécessiter une intervention chirurgicale			
<b>ORGANES INTERNES</b>			
Rétention abdominale des testicules (cryptorchidie) opérée			
Rétention abdominale des testicules (cryptorchidie) non opérée			
Hypospadias			
Ovaires atrophiés ou absents			
Imperforation vaginale			
Ambiguïté sexuelle			
Autre malformation génitale			
Malformation gastro-intestinale			
Maladie de Hirschprung ou de Crohn (maladie des intestins)			
Enfant ayant eu un ou plusieurs calculs, sans atteinte de la fonction rénale, demandant un traitement médical ou acte chirurgical			
Malformation ou troubles de la fonction rénale			
Hypothyroïdie traitée médicalement			
Diabète insulino-dépendant			
Mucoviscidose			
Colectomie partielle			
<b>HERNIE</b>			
Hernie inguinale opérable			
Hernie ombilicale opérable			
<b>SYSTEME NERVEUX CENTRAL, CRANE ET GENETIQUE</b>			
Antécédents de crise d'épilepsie			
Epilepsie installée			
Insomnie / somnambulisme			
Hydrocéphalie			

	OUI	NON	PEUT-ETRE
Microcéphalie			
Spina bifida			
Myélomeningocèle mineure			
Neurofibromatose			
Trisomie 21 (syndrome de Down)			

**Adresse :**

**Date :**

**Signature(s) :**