

LA MALNUTRITION INTRA-UTERINE ET/OU POST NATALE

I. CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT

La malnutrition est une entrave à la croissance et au développement : de l'état nutritionnel de l'enfant, dans son jeune âge, découle son développement physique, mental et social. Les carences en vitamines et sels minéraux peuvent entraîner un retard de croissance et mettre en péril le développement intellectuel. Les enfants qui survivent à la malnutrition peuvent avoir une capacité d'apprentissage réduite.

Les effets les plus dévastateurs de la malnutrition se produisent :

- avant la naissance, car le fœtus ne peut pas se développer correctement faute d'apports nutritionnels (en quantité et en qualité) couvrant les besoins
- et pendant les premières années de la vie d'un enfant lorsque son bon développement physique et mental requière des apports adaptés.

II. LES CARENCES ET LEURS CONSEQUENCES

1) En iode :

Elles entraînent de graves troubles mentaux ou physiques :

- goitre (augmentation du volume de la glande thyroïde),
- troubles du langage,
- surdit ,
- cr tinisme c'est- -dire retard mental.

Les effets les plus n fastes se produisent sur le cerveau du fœtus et des b b s, elles augmentent aussi le risque de mortalit  infantile et les fausses couches.

2) En fer :

Elles sont responsables d'an mies dites ferriprives.

L'an mie accro t le risque d'h morragie et de septic mie (infection bact riale grave) pendant l'accouchement et intervient dans 20% des d c s maternels. Le manque de fer met en danger le d veloppement mental des nourrissons.

3) En vitamine A :

Elles peuvent entra ner :

- la c cit 
- ou l'affaiblissement du syst me immunitaire. Les enfants qui souffrent de carences en vitamine A ne peuvent pas  tre prot g s de maladies comme la rougeole, les diarrh es ou les infections respiratoires.

4) En vitamine D

Le rachitisme est une maladie presque toujours due   une carence en vitamine D.

Elle se caractérise cliniquement par :

- des symptômes osseux (déformation du crâne, fontanelle élargie, chapelet costal, proéminence malléolaire),
- une hyperlaxité articulaire,
- une hypotonie musculaire
- et une tendance aux pneumopathies et aux infections à répétition.

Le traitement repose sur le calcium et la vitamine D.

III. LES TROUBLES DE L'IMMUNITE

Un lien est désormais clairement établi entre la malnutrition précoce, en début de vie – y compris la période de croissance fœtale – et l'apparition ultérieure d'affections chroniques en particulier des maladies infectieuses.

La malnutrition affaiblit le système immunitaire exposant davantage les enfants à des épisodes diarrhéiques graves et nombreux, ainsi qu'à certaines maladies infectieuses. L'enfant risque également d'être exposé à des formes plus sévères de maladies habituellement bénignes et sa capacité de récupération d'être moindre.

IV. POIDS ET DEGRE DE MALNUTRITION

Pourcentage du poids de référence pour l'âge	Interprétation
90-110%	Normal
75- 89%	Malnutrition grade I
60-74%	Malnutrition grade II
< 60%	Malnutrition grade III